

学校肺结核 防治

云龙区疾病预防控制中心




主要内容



- 一、肺结核疫情现状
- 二、结核病简介
- 三、学校结核病常规预防措施
- 四、学校面对肺结核疫情如何处置
- 五、学校结核病的特点

一、肺结核疫情现状





年全球新感染结核病人约 万

我国新发感染约 万人，排名第二，仅次于印度

徐州市学生结核病疫情情况

2013-2017年徐州市活动性肺结核患者、学生肺结核患者








年以来徐州市报告结核病
涉及 所学校，其中包括学生及
老师，主要集中在大学、中学

二、结核病简介

- 结核病是由结核杆菌引起的慢性感染性疾病。结核杆菌可能侵入人体全身各种器官，但主要侵犯肺脏，称为肺结核病。





✓肺结核是由结核杆菌引起、经呼吸道传播的慢性传染病，主要通过病人**咳嗽、打喷嚏**或大声说话时喷出的**飞沫**传播给他人，这种简单的传播途径使许多人都容易被结核病患者传染。





三、学校结核病常规预防措施

1. **晨检工作**。中小学校应当由班主任或班级卫生员 实晨检工作，发现 结核可疑症状 后，应当及时报告学校卫生（保健）室。

肺结核可疑症状有哪些？



- ① 全身症状，主要有低热，常在午后或劳动后体温升高；入睡后出汗（盗汗）；疲倦乏力，性情急躁；体重减轻、消瘦；月经失调等。
- ② 呼吸系统症状，主要有咳嗽，咳嗽咳痰达2周及以上、或出现咯血痰中带血者，应考虑有肺结核的可能；胸部隐痛；严重者可有呼吸困难等。



2. 因病缺勤病因 查及登 制度。班主任(或 辅导员)应当及时了 因病缺勤学生的患病情况和可 原因。如怀疑为 结核，应当及时报告学校卫生(保健)室或校医 ，并由学校卫生(保健)室或校医 了 学生的断和治疗情况。

学生、 师 病假时，应提供病情 明，校方应妥善保存。

3. 保 学校环境卫生。加强教室、宿 、图书 等人 场所的 、消毒。做好校园环境的清扫保洁，消 卫生死 。



4. **健康教育**。开展对师生结核病防治知识和技能的教 育，使其养成 好的学习、卫生和生活等习惯，有效 预防结核病，减少结核病的危害。

5. **病例报告**。对学校发现的 结核疑似病例或确 定病例，由学校疫情报 告人立即向属地疾病 控制机构和教 育行政 部门报告。

云 南 区 疾 控 中 心：0516-83826573

四、学校面对肺结核疫情如何处置

1. 做好病例管理、休复学（ ）管理工作。结核临床 断病例、确 病例应按照 求 登 、治疗和管理。


（1）休学管理。对于 休学的学生（ 师） 取休学（ ）管理，学校应做好 服劝 工作。休学学生实 住 或居家 离治疗。

（2）复学管理。患病学生凭结核病 治定点医 出具的复学医学 明后，方可复学。



2. 对经定点医 断不具传染性、不 休学的病例和 服 ，校医或班主任应当协助督促其按时服 ，并定期到指定的医 复查。

3. 组织密切接触 筛查。 结核病例的密切接触 筛查工作由学校组织， 疾病 控制中心 指导， 定点医 具体实施。

① 筛查发现的单纯PPD强 性、X线 片正常的密切接触 ， 学校应开 展 心、细 的教 服工作， 在其知情、不拒绝的基础上接受 性服 。



PPD试验（结核菌素试验）现场



②密切接触 筛查无异常的学生和教 员工可正常上 、上班，学校应当 求其对 健康状况 我 察。一旦出现咳嗽、咳痰等结核可疑症状，应当及时到当地结核病 治定点医 就 。

4.加强晨检及因病缺课登记。

学校在发现肺结核病例后，必须加强晨检及因病缺课登记和追踪，密切关注与病例同班级、同宿舍学生的健康状况。一旦出现肺结核可疑症状者，学校应立即督促其就诊，并于**24**小时内向疾病预防控制中心报告。

● ● ● 五、学校结核病的特点 ● ● ●

(一) 学校结核病的敏感性

▲媒体的敏感：不明真相情况下的 导，易使事态发展

家 的敏感：易 传感，引 社会的影响

学生的敏感：易 现代化的 工具（网络、电 等）
传播不正确的信息

学校的敏感：不 合、不报告、不管理

● ● ● (二) 学校结核病的易感性 ● ● ●

学生是一个特殊的群体：

人口密、居住拥挤，易引结核病传播和感染

少年是结核病好发年

中学生处于心理生理发育期，免疫功能不稳定

营养差、学习压力大、自我健康保护意识差

一旦发生结核病疫情，如处理不及时，易成学校结核病暴发。

● ● ● (三) 学校结核病的 性 ● ● ●

大部分患无 症状；

有症状，继续扛着上学；

偷偷治疗， 继续上 ；

瞒、 报病情。

谢谢!